

허가사항 변경지시 : 의약품관리과-11095
변경일자 : 2023.01.14.

○ 린코마이신염산염 단일제(캡슐제) 허가사항 변경명령(안)

효능·효과

○ 유효균종

린코마이신에 감수성인 포도구균, 연쇄구균(장내구균 제외), 폐렴연쇄구균, 시겔라

○ 적응증

- 종기, 연조직염, 생인손, 단독, 림프절염
- 기관지염, 농가진, 폐렴, 편도염, 인두염
- 골수염, 유선염
- 성홍열
- 세균성이질
- 중이염, 부비동염

용법·용량

- 성인 : 린코마이신으로서 중증감염에 1회 500 mg(역가)을 8시간마다 경구투여 하며, 심한 중증감염에는 1회 500 mg(역가)을 6시간마다 투여한다.
- 소아(28일 이상) : 이 약으로서 중증감염에 1일 체중 kg당 30 mg(역가)을 3 ~ 4회 분할 투여한다.

베타-용혈성연쇄구균 감염증에는 치료 후에 속발될지도 모르는 류마티스열이나 사구체신염을 예방하기 위하여 최소한 10일 이상 계속 투여하는 것이 바람직하다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

○ 린코마이신염산염 단일제(캡슐제) 허가사항 변경대비표

| 항목 | 기허가사항 | 변경(안) |
|----------|--|---|
| 효능 효과 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 유효균종(생략) ○ 적응증 <ul style="list-style-type: none"> - 종기, 연조직염, 생인손, 단독, 림프절염 - 기관지염, 농가진, 폐렴, 편도염, 인두염 - 골수염, 관절염, 유선염 - 패혈증 (이하 생략) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 유효균종(생략) ○ 적응증 <ul style="list-style-type: none"> - 종기, 연조직염, 생인손, 단독, 림프절염 - 기관지염, 농가진, 폐렴, 편도염, 인두염 - 골수염, <삭 제>, 유선염 - <삭 제> (이하 생략) |
| 용법 용량 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 성인 : 린코마이신으로서 중증감염에 1회 500mg(역가)을 8시간마다 경구투여하며, 심한 중증감염에는 1회 500mg(역가)을 6시간마다 투여한다. ○ 소아(28일 이상) : 이 약으로서 중증감염에 1일 체중 kg당 30mg(역가)을 3~4회 분할 투여하며, 심한 중증감염에는 체중 kg당 60mg(역가)을 3~4회 분할 투여한다. <p>베타-용혈성연쇄구균 감염증에는 치료 후에 속발될지도 모르는 류마티스열이나 사구체신염을 예방하기 위하여 최소한 10일 이상 계속 투여하는 것이 바람직하다.</p> <p>연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ○ 성인 : 린코마이신으로서 중증감염에 1회 500mg(역가)을 8시간마다 경구투여하며, 심한 중증감염에는 1회 500mg(역가)을 6시간마다 투여한다. ○ 소아(28일 이상) : 이 약으로서 중증감염에 1일 체중 kg당 30mg(역가)을 3~4회 분할 투여한다. <p><삭 제></p> <p>연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.</p> |